

Medicinas para la Fiebre y Dolor

Acetaminophen

Acetaminophen se puede comprar sin receta. Se puede dar a niños de dos meses de edad. Se les puede dar los productos. Acetaminophen (como Tylenol). Todos tienen la misma dosis. Dale la dosis correcta según lo que pesen cada 4 - 6 horas.

	Medidas	10-11 Libras	12-17 Libras	18-23 Libras	24-35 Libras	36-47 Libras	48-59 Libras	60-71 libras	72-95 Libras	96+
Jarabe (160mg/5ml)	4-6 Horas	1/4 Cucharada	1/2 Cucharada	3/4 cucharada	1 cucharada	1 1/2 Cucharada	2 cucharada	2 1/2 cucharada	3 cucharada	4 cucharada
tableta masticable (80mg)	4-6 Horas			1 1/2 tableta	2 tabletas	3 tabletas	4 Tabletas	5 Tabletas	6 tabletas	8 tabletas
Tabletas masticable (160mg)	4-6 Horas				1 Tableta	1 1/2 tableta	2 Tableta	2 1/2 Tableta	3 Tableta	4 Tableta
Tabletas Adultos (325mg)	4-6 Horas							1 1/2 Tableta	1-1 1/2 Tableta	2 Tableta

Sopositorios de Acetaminophen son disponibles sin receta. Con un sopsitorio rectal tambien se puede controlar la fiebre y dolor o si tiene ataques epileptico que es causados por la fiebre. Insercion rectal en dosis de 120mg, 325mg y 650mg. Use el mismo dosis que la tableta para el sopsitorio.

Ibuprofen

Ibuprofen (Motrin, Advil) es disponible sin receta. Da la dosis correcta para el peso de tu niño o niña. Se puede dar cada 6-8 horas. No se da ibuprofen a niños menos de seis meses de edad. No más si es resettato por el doctor.

		10-11 Libras	12-17 Libras	18-23 Libras	24-35 libras	36-47 libras	48-59 libras	60-71 libras	72-95 Libras	96+ libras
Jarabe (160mg)	6-8 horas	1/4 cucharada	1/2 cucharada	3/4 Cucharada		Medidas	2 Cucharada	2 1/2 Cucharada	3 cucharada	4 cucharada
Tabletas Masticables (50mg)	6-8 horas			1 1/2 Tableta	2 Tabletas	3 Tabletas	4 Tabletas	5 tabletas	6 tabletas	8 Tabletas
Tabletas maticables (100mg)	6-8 horas				1 tableta	1 1/2 tableta	2 tabletas	2 1/2 tabletas	3 tabletas	4 tabletas
Tabletas adultas (200mg)	6-8 horas								1 1/2 tabletas	2 tabletas

Alternando o Cambiando Acetaminophen y ibuprofen

Si tu doctor te a ordenado que alternes Acetaminophen y ibuprofen aga lo.

- > Alterna Acetaminophen y Ibuprofen cada 4 horas
- > Alterna Medicina por solo 24 horas, despues solo un medicamento

Combinando Acetaminophen y Ibuprofen no es recommendable. Combinando puede causar confusion, error en el dosis o envenamiento. Tambien no es nesasario de controlar la fiebre tan serca.

Evita la Aspirina

Ninos (menos de 21 años) no deven de tomar Aspirina. Si tiene la varicella o influencia (cataro o dolencia de garganta). Es recomedado en basado en varios estudios que la aspirina es relacionado con el syndrome Reye's una enfermedad grave encephalitislike. Casi todo los pediatras an parado de usar aspirina para la fibre.